ZGODA NA LECZENIE SZYNĄ MAGO

SZYNA MAGO jest SZYNĄ DIAGNOSTYCZNĄ. To akrylowa szyna wkładana pomiędzy szczękę górną, a żuchwę, w celu stabilizacji łączącego je stawu skroniowo-żuchwowego. Działa podobnie jak aparat ortopedyczny zakładany pomiędzy dwie kości, służący do stabilizacji stawu je łączącego.

SZYNA MAGO STABILIZUJE STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY. MAGO NIE LECZY ZGRYZU, NIE PRZESTAWIA ZĘBÓW I NIE DZIAŁA JAK APARAT ORTODONTYCZNY.

Jakiego działania szyny można się spodziewać:

- zniesienia pierwotnej/patologicznej pamięci mięśniowej mięśni żucia;

- odciążenia stawów i zębów od przeciążeń i starcia dzięki eliminacji nieprawidłowych nawyków ruchowych narządu żucia tzw. parafunkcji;

- nauki pionowego typu żucia;

- umożliwienia żuchwie uzyskania stabilnej pozycji względem szczęki;

- diagnostyki objawów ze strony mięśni lub stawów skroniowo-żuchwowych przed wykonaniem ostatecznego leczenia;

- oceny potrzeby złożoności ostatecznego leczenia.

Dalsze leczenie planowane jest po zakończeniu leczenia szyną. W celu ustabilizowania pozycji żuchwy osiągniętej przez szynę, konieczne jest odpowiednie ustawienie zębów.

Plan leczenia po szynie może obejmować:

- korektę zgryzu poprzez szlifowanie zębów lub ich odbudowę kompozytową;

- leczenie ortodontyczne;

- leczenie protetyczne;

- operacje ortognatyczną;

- kombinację wszystkich powyższych.

SZYNA MAGO DZIAŁA JEŚLI JEST NOSZONA CAŁY CZAS, tzn. **24 H/DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU.** Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy jest noszona również w trakcie jedzenia i jest zdejmowana tylko do zabiegów higieny jamy ustnej.

SZYNA WYMAGA **WIZYT KONTROLNYCH CO 1 LUB 2 TYGODNIE**, płatnych każdorazowo wg cennika. **UWAGA!** W razie wystąpienia silnego dyskomfortu lub objawów bólowych pacjent ma natychmiast zgłosić się na kontrolę.

Podczas użytkowania szyny Mago niedozwolone jest jedzenie twardych landrynek, rozgryzanie kostek lodu czy otwieranie butelek zębami, ponadto niedozwolone jest uprawianie sportów siłowych lub sportów walki, którym może towarzyszyć zaciskanie zębów. Wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania szyny będą wiązały się z obciążeniem Pacjenta kosztami wykonania nowej szyny. Prosimy również pamiętać, że wszelkie zmiany kształtu zębów górnych (wymiana wypełnień) podczas użytkowania szyny wiąże się z koniecznością korekty szyny lub wypełnienia, ponieważ brak takich działań doprowadzi również do pęknięcia szyny.

Szyna Mago ma grubość 2 mm od pierwszego kontaktu zwarciowego, co może generować pękanie, jeżeli Pacjent nieprawidłowo ją użytkuje. Wykonanie grubszej szyny będzie zaburzać proces adaptacji i fonetyki.

CZAS LECZENIA to 3-9 miesięcy.

Po zakończeniu leczenia szyną następuje ponowna rejestracja zgryzu, analiza zgryzu i przygotowanie ostatecznego planu leczenia.

Przeczytałam (-em) i zrozumiałam (-em) powyższe informacje.

Miałam (-em) możliwość zadawania dodatkowych pytań.

Zgadzam się na zaproponowaną terapię i zobowiązuję się ponieść koszty jej przeprowadzenia.

Data i podpis pacjenta

…….